

Nidificazione di Rampichino alpestre *Certhia familiaris* in nido artificiale a mezzo-tronchetto

GUIDO PREMUDA*

*Via Da Palestrina, 20 - 40141 BOLOGNA (BO)

KEY WORDS: *Certhia familiaris*, breeding, nestbox, Prealpi Orobiane, Bergamo, Northern Italy

Riassunto - Viene riportata la nidificazione di Rampichino alpestre *Certhia familiaris* in nido artificiale a mezzo tronchetto, sulle Prealpi Orobiane, provincia di Bergamo.

Summary - It is reported the breeding of Treecreeper *Certhia familiaris* in a "half log" nestbox, in Prealpi Orobiane, Bergamo (N Italy).

Introduzione

Nella primavera del 2001 è avvenuta una nidificazione di Rampichino alpestre *Certhia familiaris*, in un nido artificiale cosiddetto "a mezzo-tronchetto", installato in un piccolo bosco coetaneo di impianto artificiale, composto da essenze autoctone con prevalenza di Abete rosso *Picea abies*, ma anche con presenza di latifoglie, cespugli, siepi e prati sfalcati, nelle vicinanze di un piccolo paese.

L'area interessata si trova in località Zambra Alta, a 1200 m.s.l.m., in Alta Val Serina nelle Prealpi Orobiane, provincia di Bergamo. Nel bosco sono installati altri 37 nidi artificiali di differenti dimensioni e tipologie.

Il nido a "mezzo-tronchetto" per rampichini, è stato realizzato mediante lo scavo della metà di una porzione di un tronchetto di abete. Questa è stata installata su un abete, a circa 1,5 m da terra, dopo averla completata con il fondo e il tetto, ricoperto di guaina catramata per evitare dannose infiltrazioni.

Misure del nido

- Foro di involo: 2x5 cm (verticale, laterale)
- Altezza interna dal foro al pavimento: 14 cm
- Dimensioni della cavità interna: 10x8x22 cm circa
- Altezza totale del nido: 26 cm

La coppia impegnata nella costruzione del nido è stata osservata il 31/03/2001, mentre il 12/05/2001 è stato rilevato il buon esito della incubazione, con la presenza di 5 giovani nel nido, regolarmente imbeccati da entrambi i genitori.



Photo G. Premuda

La nidificazione del Rampichino *Certhia familiaris* nel nido artificiale a mezzo-tronchetto

Nonostante il maltempo avesse pesantemente influito sull'esito e sul ritardo di alcune nidificazioni, con l'abbandono di nidi con uova di Cinciallegra *Parus major*, Cinciarella *Parus caeruleus* e Cincia mora *Parus ater*, il giorno 02/06/01 si è constatato l'avvenuto involo dei giovani, non riscontrando nessun segno di predazione.

In Italia sono note poche segnalazioni di nidificazione della specie in tale tipologia di nido artificiale (CORVAJA, 1990), che purtroppo non viene installato con frequenza, nonostante sia efficace, insieme agli altri modelli "a cuneo" e "scandinavo" (RABACCHI, 1985), come sostitutivo delle cavità preferite dai rampichini *Certhia sp.*, presenti solitamente nelle profonde spaccature della corteccia degli ormai rari alberi vetusti.

Testi consultati

- ABRAM S., FRAPPORTI C., 1988 - Uccelli, nidi artificiali e mangiatoie - Manfrini, Trento
- CORVAJA F., 1990 - Note sui nidi artificiali per Rampichino alpestre *Certhia familiaris macrodactyla* - PICUS 3:135-138.
- PREMUDA G., BEDONNI B., BALLANTI F., 2000 - Nidi artificiali - Calderini-Edagricole, Bologna.
- RABACCHI R., 1985 - Sulla nidificazione del Rampichino alpestre *Certhia familiaris macrodactyla* (C.L.Brehm) in nidi artificiali (modello scandinavo) nel Parco Naturale di Paneveggio-Pale di San Martino (TN) - PICUS 11(2):59-67.
- RABACCHI R. (a cura di), 1999 - Siepi, nidi artificiali e mangiatoie - Cierre Edizioni, Verona.

Ricevuto ottobre 2001